

Glexor

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ του προϊόντος με αρ. άδειας κυκλοφορίας: 70178
Ημερομηνία χορήγησης άδειας παράλληλης εισαγωγής: 03/12/2019 (αρ.πρ. 12167/290055)
Εγγυημένη Σύνθεση: δραστική ουσία: Glyphosate 36% β/ο
(υπο μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 48,6 % β/ο), **βοηθητικές ουσίες:** 34,37% β/β

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ(SL)

**Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο
για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών
(αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων)
και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών.**

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



Παρασκευαστής:
Barclay Chemicals, Ιρλανδία



**Τοξικό για τους
υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**

Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
 **χελλαφαρμ** Α.Ε.

1° χλμ. Λ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100,
19002, Παιανία, Τηλ.: 210.68.00.900,
info@hellafarm.gr , www.hellafarm.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 20 ΛΙΤΡΑ

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπφρουτ, Κιτριά), **ΑΚΡΟΔΡΥΑ** (Αμυγδαλιά), **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά), **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά), **ΕΛΙΑ** (επιτραπέζιες, ελαιοποιήσιμες): Μία (1) έως 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 28 ημερών: **α) Για Ετήσια ζιζάνια⁽¹⁾ (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) με δόση:** 150-200 κ.εκ./στρ., για **Μολόχα** (*Malva* sp.), **Τσουκνίδα** (*Urtica* sp.), **Πολυκόμψι** (*Polygonum* sp.), **Αντράκλα** (*Portulaca oleracea*) **με δόση:** 400-600 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός επί της γραμμής της δεντροστοιχίας, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωήρης τους ανάπτυξης. **β) Για Πολυετή ζιζάνια⁽²⁾ με δόση:** 500-800 κ.εκ./στρ., για **Αγριάδα** (*Cynodon dactylon*) **με δόση:** 750-800 κ.εκ./στρ., για **Βέλουνη** (*Sorghum halepense*) και **Φτέρη** (*Pteridium aquilinum*) **με δόση:** 500 κ.εκ./στρ., για **Περικοκιάδα** (*Convolvulus arvensis*) και **Κίρσιο** (*Cirsium arvense*) **με δόση:** 800 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός επί της γραμμής της δεντροστοιχίας, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. Όταν η εφαρμοζόμενη δόση είναι μεγαλύτερη των 633 κ.εκ. σκ./στρ. να πραγματοποιείται εφαρμογή μόνο στο 10% της έκτασης του αγρού δηλαδή spot (εντοπισμένη) εφαρμογή. Για **Κύπερη** (*Cyperus* sp.): i) **1^η** εφαρμογή κατά την άνθηση **με δόση:** 600 κ.εκ./στρ., ii) **2^η** εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης **με δόση:** 500 κ.εκ./στρ. Όταν η εφαρμοζόμενη δόση είναι μεγαλύτερη των 600 κ.εκ. σκ./στρ. να πραγματοποιείται εφαρμογή μόνο στο 10% της έκτασης του αγρού. **ΚΑΠΝΟΣ:** Για **Οροβάχνη** (*Orobancha ramosa*), 2 εφαρμογές / καλλ./τική περίοδο: Ψεκασμοί καλύψεως: **α)** 40 ημέρες μετά τη μεταφύτευση **με δόση:** 40 κ.εκ./στρ. **β)** 60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση **με δόση:** 60 κ.εκ./στρ. **ΑΓΡΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ:** Μία (1) εφαρμογή / καλλ./τική περίοδο όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωήρης τους ανάπτυξης. **α) Για Ετήσια ζιζάνια⁽¹⁾ (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) με δόση:** 150-200 κ.εκ./στρ., για **Μολόχα** (*Malva* sp.), **Τσουκνίδα** (*Urtica* sp.), **Πολυκόμψι** (*Polygonum* sp.), **Αντράκλα** (*Portulaca oleracea*) **με δόση:** 400-600 κ.εκ./στρ. **β) Για Πολυετή ζιζάνια⁽²⁾** (ως ανωτέρω) **με δόση:** 500-600 κ.εκ./στρ. (ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω). **ΑΚΑΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ** (βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, νεκροταφεία, πλατείες, πλάι σε δρόμους και εθνικές οδούς, σε χώρους με φωτοβολταϊκά πάνελ, σε αστικές και αγροτικές περιοχές): Μία (1) μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 21 ημερών: **α) Για Ετήσια ζιζάνια⁽¹⁾ (αγρωστώδη και πλατύφυλλα) με δόση:** 150-200 κ.εκ./στρ., για **Μολόχα** (*Malva* sp.), **Τσουκνίδα** (*Urtica* sp.), **Πολυκόμψι** (*Polygonum* sp.), **Αντράκλα** (*Portulaca oleracea*) **με δόση:** 400-600 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωήρης τους ανάπτυξης. **β) Για Πολυετή ζιζάνια⁽²⁾** (ως ανωτέρω) **με δόση:** 500-1000 κ.εκ./στρ. (ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανίου ως ανωτέρω). Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. Όταν η εφαρμοζόμενη δόση είναι μεγαλύτερη των 633 κ.εκ. σκ./στρ. να πραγματοποιείται εφαρμογή μόνο στο 10% της έκτασης του αγρού δηλαδή spot (εντοπισμένη) εφαρμογή. **γ) Για Ευλώδεις θάμνους, Βάτα** (*Rubus* sp.), **με δόση:** 500-1000 κ.εκ./στρ. Όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη. Όταν η εφαρμοζόμενη δόση είναι μεγαλύτερη των 633 κ.εκ. σκ./στρ. να πραγματοποιείται εφαρμογή μόνο στο 10% της έκτασης του αγρού δηλαδή spot (εντοπισμένη) εφαρμογή. **ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ:** Για **Υδροχαρή ζιζάνια με δόση:** 800-1000 κ.εκ./στρ. Μία (1) εφαρμογή / καλλ./τική περίοδο κοντά ή κατά την άνθηση των ζιζανίων. Να πραγματοποιείται εφαρμογή μόνο στο 10% της έκτασης του αγρού δηλαδή spot (εντοπισμένη) εφαρμογή. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-40 λίτρα/στρ. σε όλες τις περιπτώσεις εκτός του **καπνού** όπου ο όγκος ψεκ. υγρού είναι 30-40 λίτρα/στρ. **Μέγιστη δόση στο σύνολο των εφαρμογών / 12 μήνες: 432 γρ. glyphosate/ στρέμμα.** **Παρατηρήσεις:** 1. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφύλλους και μη επουλωμένους πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες από το τρίτο (3^ο) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. 2. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια *Malva* spp. (μολόχα), *Urtica* spp. (τσουκνίδα), *Polygonum* spp., *Portulaca oleracea* (αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 400-600 κ.εκ./στρέμμα, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους. 3. Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μία με δύο εφαρμογές (χειμώνα-άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωήρης τους ανάπτυξης. 4. Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. 5. Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτρών) γύρω από τα μπέκ για την αποφυγή φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες. 6. Η χρήση στην ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά. 7. Για την αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15 – 30 εκατοστά. 8. Για την φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής. 9. Να μην γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες. 10. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για σποροπαραγωγή. 11. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. 12. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεομένους στο έδαφος ελιές. 13. Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκείμενου να αποφευχθούν υπολείμματα. 14. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά, Αχλαδιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιφφρουτ, Κιτριά, Αμυγδαλιά, Βερικοκιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά, Κερασιά: 21 ημέρες. Ελιά, Καπνός: 7 ημέρες. **Ακαλλιέργητες εκτάσεις, Κατά μήκος αρδευτικών καναλιών:- Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Σε αγρούς μετά την συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκατεσσάρων (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους. **ii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φύλλα. Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν. Να μην επιτρέπεται η είσοδος στα ζώα για τις επόμενες 21 μέρες. **Τρόπος εφαρμογής:** Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν φυτοτοξικότητας ή συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς. Για την οροβράχη στον καπνό εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκασμό καλύψεως της φυτείας. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI). **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου. **Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Συνδυαστικότητα:** Μην αναμειγνύεται το σκεύασμα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. **Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογίας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλίστει:** Τα υπολείμματα της καλλιέργειας οπωριού να μην χρησιμοποιούνται για καλλιέργεια μανταρινιών. Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα πρανή και με τρόπο ώστε σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην πάνε στο νερό. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική glyphosate, η οποία ανήκει στην **ομάδα 9** κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. **Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του. **Συνθήκες αποθήκευσης-Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. **Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια θα πρέπει να φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρομάνικο πουκάμισο. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Χρησιμοποιήστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Η χρήση αποθήκης και οξίλης δεν ενδείκνυται. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777**

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Αρ. Παρτίδας, Ημερ. Παρασκευής:
Βλέπε άνω μέρος φιάλης