UPPER LAYER A SIDE

+155. mm

+50. mm

ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες/ φλόγες/ θερμές επιφάνειες - Μην καπνίζετε. Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια. Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή. **Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και απορρίψτε τα ασφαλώς. - Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και σιφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. **- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. **- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Σπλύνετέ τα αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **- Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **- ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ. Πληροφορίες για το γιατρό:** Θεραπευτικά μέτρα: Επιτόπιος χειρισμός: συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία. Μετά από επαφή με τα μάτια, ενστάλαξη τοπικά αναισθητικών σταγόνων π.χ. 1% amethocaine hydrochloride. Χορηγήστε αναλγητικά αν χρειάζεται. Δεν υπάρχει αντίδοτο. **Αντιμετώπιση σπασμών:** Χορηγήστε diazepam: για ενήλικες 5 - 10 mg ενδοφλεβίως. Χορηγήστε άσο χρειάζεται ώστε να πρεμήσει πλήρως ο παθών. Για παιδιά 2.5 μg ενδοφλεβίως. **Αντενδείξεις:** ατροπίνη και παράγωγα αδρεναλίνης. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 2107793777**

262

DELIR EC

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
Εγγυημένη σύνθεση: Deltamethrin 2,5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 97,19% β/β

ΑΑΔΑ: 14480/ 27.05.2014

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων.
Το Deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

Περιεχόμενο: 100κ.εκ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

UFI:RRDE-A4AD-QSKC-TS39

Ημ/νία παραγωγής, Αρ.Παρτίδας: βλ.επί της συσκευασίας

Κάτοχος της άδειας:
Arysta LifeScience Benelux Srl
Rue de Renory 26/1,
B-4102 Ougrée, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΕΛΛΑΦΑΡΜ
1ο χλμ. Λ.Παιανίας Μαρκοπούλου,
Τ.Θ.100,19002, Παιανία,✆210 6800900
info@hellafarm.gr, **www.hellafarm.gr**

Ανοίξτε εδώ για συνημμένες οδηγίες

UPPER LAYER BACK A SIDE

Πεδίο Εφαρμογής – Στόχοι – Δόσεις σε κ.εκ. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ / 100 ΛΙΤΡΑ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ – Τρόπος και χρόνος εφαρμογής/ επεμβάσεων – Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Εφαρμόζεται ένας (1) ψεκασμός ανά καλλιεργητική περίοδο με την εμφάνιση των προσβολών. **Portokαλιά, Γκρέπ-φρουτ, Νεραντζιά:** α) για Αφίδες: 30-50 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 100 λτρ./στρ. (30-50 κ.εκ./στρ.). β) για Λεκάνιο, Μύγα της Μεσογείου: 50 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 100 λτρ./στρ. (50 κ.εκ./στρ.). **Λεμονιά, Μανταρινιά:** για Αφίδες: 30 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 100 λτρ./στρ. (30 κ.εκ./στρ.).**ΑΚΡΟΔΡΥΑ: (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά):** Εφαρμόζονται έως δύο (2) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο. Για Αφίδες:30 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ.υγρού 140λτρ/στρ.(42-50 κ.εκ./στρ) ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Για Καρπόκαψα καρυδιάς, Καρπόκαψα καστανιάς:50κ.εκ./100λτρ ψεκ.υγρού, με όγκο ψεκ.υγρού 100λτρ/στρ.(42-50 κ.εκ./στρ) ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Για Ευρύτομο: 50 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ.υγρού 100λτρ/στρ.(50 κ.εκ./στρ) εφαρμογή με την έναρξη πτήσεων των ακμαίων με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά):** Εφαρμόζονται έως δύο (2) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Για Καρπόκαψα, Αφίδες, Ψύλλα μηλιάς: 30-50*κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ.υγρού 100-140λτρ/στρ.(30-50 κ.εκ./στρ). Για Φυλλοδέτες: 35 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ.υγρού 100-140λτρ/στρ.(35-50 κ.εκ./στρ). Για Ψύλλα αχλαδιάς: 50 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ.υγρού 100λτρ/στρ.(50 κ.εκ./στρ).**ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά):** Εφαρμόζεται ένας (1) ψεκασμός ανά καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προσβολών. Για Φυλλοδέτες , Ανάρσια:35 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ.υγρού 100-140λτρ/στρ.(35-49 κ.εκ./στρ). Για Ραγολέτιδα:40-50 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ.υγρού 100-140λτρ/στρ.(40-70 κ.εκ./στρ). Για Μύγα Μεσογείου: 50κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ.υγρού 100-140λτρ/στρ.(50-70 κ.εκ./στρ). Για Αφίδες, Καρπόκαψα της Δαμασκηνιάς, 30-50 κ.εκ./100 λιτ.ψεκ.υγρού, με όγκο ψεκ.υγρού 100-140λτρ/στρ. (30-70 κ.εκ.στρ.) **ΑΜΠΕΛΙ**::** Εφαρμόζονται έως τρεις (3) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Για Ευδεμίδα: 1η γενεά: 50κ.εκ./100 λτρ ψεκ.υγρού - 2η και 3η γενεά: 50-70κ.εκ./100λτρ.ψεκ.υγρού με όγκο ψεκ.υγρού 100λτρ/στρ.(50-70 κ.εκ./στρ). Για Κοχυλίδα: 50-70 κ.εκ./100 λτρ. ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ.υγρού 100λτρ/στρ.(50-70 κ.εκ./στρ). Για Τζητζικάκια: 50 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ.υγρού 100λτρ/στρ.(50 κ.εκ./στρ). **ΦΡΑΟΥΛΑ(Υπαίθρου+Θερμοκηπίου):** Εφαρμόζονται έως τρεις (3) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Για Αφίδες: 50 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ.υγρού 50-100λτρ/στρ.(25-50 κ.εκ./στρ). **ΕΛΙΑ:** Εφαρμόζεται ένας (1) ψεκασμός ανά καλλιεργητική περίοδο. Για Δάκο: 50κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ.υγρού 100-140λτρ/στρ.(50-70 κ.εκ./στρ) σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες. Για Λεκάνιο: 50 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ.υγρού 100-140λτρ/στρ.(50-70 κ.εκ./στρ) με την εμφάνιση των προσβολών. Για Βαμβακάδα: 30-50 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ.υγρού 100-140λτρ/στρ.(30-70 κ.εκ./στρ) με την εμφάνιση των προσβολών. Για Πυρηνοτρήτη: ανθόβια γενεά: 30 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού - καρποβια γενεά: 50 κ.εκ./100 λίτ. ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ.υγρού 100-140λτρ/στρ.(30-70 κ.εκ./στρ), στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) ή αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπόβια γενεά) μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες.

7mm

UPPER LAYER B SIDE

ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΠΡΑΣΟ, ΣΚΟΡΔΟ: Εφαρμόζονται έως τρεις (3) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Για Θρίπα, Κοφτοσκούληκα: 30-50 κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ.υγρού 40-50λτρ/στρ.**ΣΟΛΑΝΩΔΗ - Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα (Υπαίθρου):** Εφαρμόζονται έως τρεις (3) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Για Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρο, Αφίδες: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λτρ./στρ. (30-50 κ.εκ./στρ.). Για Βρωμούσα: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λτρ./στρ. (18-30 κ.εκ./στρ.). Για Κοφτοσκούληκα: 30-50 κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λτρ./στρ. **ΠΙΠΕΡΙΑ (Θερμοκηπίου):** Εφαρμόζονται έως τέσσερις (4) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. Για Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρο, Αφίδες: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 60-140 λτρ./στρ. (30-70 κ.εκ./στρ.). Για Βρωμούσα: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 60-140 λτρ./στρ. (18-42 κ.εκ./στρ.). Για Αλευρώδη: 70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λτρ./στρ. (42-70 κ.εκ./στρ.).**ΣΟΛΑΝΟΔΗ - Τομάτα, Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου):** Εφαρμόζονται έως τέσσερις (4) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. Για Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Δορυφόρο, Αφίδες: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λτρ./στρ. (30-50 κ.εκ./στρ.). Για Βρωμούσα: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 60-140 λτρ./στρ. (18-42 κ.εκ./στρ.). **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ - Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι (Υπαίθρου):** Εφαρμόζονται έως τρεις (3) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. Για Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λτρ./στρ., (30-50 κ.εκ./στρ.). Για Κοφτοσκούληκα: 30-50 κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 60-100 λτρ./στρ. **- Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι (Θερμοκηπίου):** Εφαρμόζονται έως τρεις (3) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. Για Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 60-140 λτρ./στρ., (30-70 κ.εκ./στρ.). **ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ:** Εφαρμόζονται έως δύο (2) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Για Πιερίδα, Μαμέστρα, Πλούζια, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα: 30-50 κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 50 λτρ./στρ. Για Πλουτέλλα: 50 κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 50 λτρ./στρ. **ΜΑΡΟΥΛΙ (Υπαίθρου):** Εφαρμόζονται έως δύο (2) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. Για Πράσινο σκουλήκι, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα: 30-50 κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 100 λτρ./στρ. Για Πλατύτερα: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λτρ./στρ. (25-50 κ.εκ./στρ.). Για Κοφτοσκούληκα: 30-50 κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λτρ./στρ. **ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ, ΦΥΛΛΑ ΣΕΛΙΝΟΥ, ΡΟΚΑ:** Εφαρμόζονται έως δύο (2) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Για Αφίδες, Σποντόπτερα, Μαμέστρα, Λλτη: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 70 λτρ./στρ. (35 κ.εκ./στρ.). Για Κοφτοσκούληκα: 30-50 κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 70 λτρ./στρ. **ΨΥΧΑΝΘΗ (Όσπρια) - Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια:** Εφαρμόζονται έως δύο (2) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Για Πράσινο σκουλήκι, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα: 30-50 κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λτρ./στρ.

7mm

UPPER LAYER BACK B SIDE

ΜΠΙΖΕΛΙΑ ΦΡΕΣΚΑ (Αρακάς): Εφαρμόζονται έως δύο (2) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Για Αφίδα Μπιζελιών, Σπόνα: 25 κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 100 λτρ./στρ. Για Αφίδα Κουκιών, Κάμπια Μπιζελιών, Θρίπα, Κοφτοσκούληκα: 30-50 κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 100 λτρ./στρ. **ΠΑΤΑΤΑ:** Εφαρμόζονται έως τρεις (3) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Για Δορυφόρο: 50κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ.υγρού 60λτρ./στρ. Για Σποντόπτερα: 30-50 κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ.υγρού 60 λτρ./στρ. **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Εφαρμόζονται έως δύο (2) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Για Ρόδινο σκουλήκι, Πράσινο σκουλήκι: 50-70 κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ.υγρού 30-50 λτρ./στρ. Για Αλευρώδη, Τζητζικάκια: 50κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ.υγρού 30-50 λτρ./στρ. Για Σποντόπτερα, Αφίδα, Κοφτοσκούληκα: 30-50κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ.υγρού 30-50 λτρ./στρ. **ΚΑΠΝΟΣ:** Εφαρμόζονται έως τρεις (3) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. Για Θρίπα, Κοφτοσκούληκα: 30-50κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ.υγρού 50-100 λτρ./στρ. **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΠΑΝΤΖΑΡΙ:** Εφαρμόζεται ένας (1) ψεκασμός ανά καλλιεργητική περίοδο με την εμφάνιση των προσβολών. Για Αφίδες, Μύγα Τεύτλων, Λλτη, Σποντόπτερα, Κοφτοσκούληκα: 30-50κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ.υγρού 50 λτρ./στρ. Για Κασσίδα: 50κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ.υγρού 50 λτρ./στρ.**ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ***. Εφαρμόζονται έως τρεις (3) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο. Για Πυραλίδα, Ζεζάμια, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα: 30-50κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ.υγρού 60 λτρ./στρ. , ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14-21 ημερών. Για *Diabrotica virgifera*: 50κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ.υγρού 60 λτρ./στρ. ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7-14 ημερών. **ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη):** Εφαρμόζεται ένας (1) ψεκασμός ανά καλλιεργητική περίοδο με την εμφάνιση των προσβολών. Για Αφίδες, Κοφτοσκούληκα: 30-50κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ.υγρού 40-60 λτρ./στρ. **ΜΗΔΙΚΗ:** Εφαρμόζονται έως δύο (2) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Για Αφίδα Μπιζελιών, Σκαθάρι Μπιζελιών, Φυτονόμο: 25κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ.υγρού 40 λτρ./στρ. **ΚΑΛΛΟΠΙΣΤΙΚΑ (Υπαίθρου+Θερμοκηπίου):** Εφαρμόζονται έως τρεις (3) ψεκασμοί ανά καλλιεργητική περίοδο, με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. Για Αφίδες, Θρίπες: 50κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού με όγκο ψεκ.υγρού 50-100 λτρ./στρ. (25-50κ.εκ./στρ.). Για Φυλλοδέτες: 35κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού με όγκο ψεκ.υγρού 50-100 λτρ./στρ. (17,5-35κ.εκ./στρ.). Για Αλευρώδη: 70κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού με όγκο ψεκ.υγρού 70 λτρ./στρ. (50κ.εκ./στρ.). **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:*ΠΡΟΣΟΧΗ:** Στα μηλοειδή η δόση των 50κ.εκ. σκευάσματος/hl πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με το μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 λίτρα/στρέμμα) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα. **Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν. ***Η εφαρμογή του DELIR στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia spp.* και *Sesamia spp.* **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, το αμπέλι και άλλες υπαίθριες καλλιέργειες με ύψος μεγαλύτερο από 50cm απαιτείται χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. **Στρατηγική διαχείρισης ανθεκτικότητας:** Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. *ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ*

7mm

BOTTOM LAYER

Στρατηγική διαχείρισης ανθεκτικότητας *συνέχεια*: Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το DELIR. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/ασάφων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Παντζάρι, Portokαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρουτ, Νεραντζιά, Αμυγδαλιά, Φυστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Αραβόσιτος, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη: 30ημέρες. Μηδική: 14 ημέρες. Αμπέλι, Ελιά, Πατάτα, Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Μαρούλι, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Μπιζέλια/Αρακάς, Καπνός, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Φύλλα Σέλινου, Μαϊντανός, Φακή, Ρεβίθια: 7 ημέρες. Φασόλια, Κουκιά: 28 ημέρες, Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Φράουλα, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Ρόκα: 3 ημέρες. **Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Η απόσυρση ή η καταστροφή του σκευάσματος να γίνεται σε υψικαμίνους που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική οργανισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε αμέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά νερά: 5 μέτρων για όλες τις υπαίθριες καλλιέργειες εκτός από τις δενδρώδεις και τα αμπέλια ή καθόλου αμέκαστη ζώνη προστασίας με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. 15 μέτρων για τις δενδρώδεις καλλιέργειες με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. Δεν απαιτείται αμέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά νερά για τα αμπέλια με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μιαν αμέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων για τις υπαίθριες καλλιέργειες κ.α. καλλιέργειες με ύψος μικρότερο από 50 cm (ή καθόλου αμέκαστη ζώνη προστασίας με χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%) από την μη γεωργική γη. Δεν απαιτείται αμέκαστη ζώνη προστασίας από την μη γεωργική γη για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, το αμπέλι κ.α. καλλιέργειες με ύψος μεγαλύτερο από 50 εκ. με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

7mm