

SEAMAC PCT

Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών.

Υγρό σκεύασμα που περιέχει εκχύλισμα φυκών (*Ascophyllum nodosum*)

- Διεγείρει την ανάπτυξη των φυτών. • Αυξάνει τις αποδόσεις
- Βελτιώνει την ποιότητα και την εμπορική αξία της παραγωγής

Χρησιμοποιείται με ψεκασμό, στα κατάλληλα στάδια ανάπτυξης

Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών. Κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά για χρήση στη γεωργία σύμφωνα με την υπ' αρ. 217217/2004 (Β' 35) υπουργική απόφαση

Οπωροφόρα (μηλιές, αχλαδιές, εσπεριδοειδή): Για παραγωγή καρπών ομοιόμορφου μεγέθους, καλύτερη συντήρησή τους στα ψυγεία και μείωση των περιπτώσεων Bitter pit. Εφαρμογή: Δύο ψεκασμοί α) αμέσως μετά το σχηματισμό των καρπιδίων β) μετά τη συλλογή. Δόση: 500 κ.εκ./στρέμμα σε 50 έως 70 λίτρα νερό, σε κάθε ψεκασμό. **Ακτινίδια:** Για παραγωγή ομοιόμορφων καρπών, μεγάλου μεγέθους. Εφαρμογή: Ψεκασμός κατά την πώση των πετάλων. Δόση: 500 κ.εκ./στρέμμα σε 40 ως 50 λίτρα νερό. Αν η πώση των πετάλων διαρκεί περισσότερο από 10 ημέρες, συνιστώνται 2 ψεκασμοί. α) Κατά την έναρξη της πώσης β) 10 ημέρες αργότερα. Δόση: 250 κ.εκ./στρέμμα σε 40 ως 50 λίτρα νερό, ανά ψεκασμό. **Φράουλες:** Για αύξηση της παραγωγής και της διατηρησιμότητας των καρπών. Οι καρποί μπορούν να διατηρηθούν ώριμοι πάνω στο φυτό πάνω από 4 ημέρες και έτσι η συγκομιδή γίνεται σε λιγότερα χέρια. Εφαρμογή: Δύο ψεκασμοί α) κατά την άνθηση, β) μετά τη συλλογή. Δόση: 500 κ.εκ./στρέμμα, σε κάθε ψεκασμό. **Κηπευτικά:** Για την αύξηση του μεγέθους, της ομοιομορφίας των καρπών και της παραγωγής. **Α. Τομάτες, αγγούρια, πιπεριές:** Δύο ψεκασμοί α) με την εμφάνιση των πρώτων ανθέων, β) μετά 3-4 εβδομάδες. **Β. Κρεμμύδια, πράσα:** Ψεκασμός στο στάδιο των 3 ως 5 φύλλων. Προσθέστε στο ψεκαστικό υγρό, ένα μη ιονικό προσκολλητικό. **Γ. Μαρούλι:** Ψεκασμός στο ξεκίνημα του σχηματισμού της καρδιάς. **Δ. Καρπούζια, πεπόνια:** Δύο ψεκασμοί α) στο 50% της κάλυψης του εδάφους β) στην πλήρη κάλυψη του εδάφους. **Ε. Καρότα:** Ψεκασμός στο ξεκίνημα της ανάπτυξης της ρίζας (ύψος φυτών 10-15 εκ.). **Γενική δόση:** 500 κ.εκ./στρέμμα ανά ψεκασμό, εκτός από τα καρπούζια και τα πεπόνια που είναι 250 κ.εκ. αντίστοιχα. **Παρατήρηση:** Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ανάλογο τρόπο και αποτελέσματα και στα υπόλοιπα λαχανικά και κηπευτικά. **Αμπέλια:** Για αύξηση της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας των καρπών και καλύτερη συντήρησή τους. Εφαρμογή: Δύο ψεκασμοί α) κατά το δέσιμο των ραγών β) μετά τη συγκομιδή. Δόση: 500 κ.εκ./στρέμμα, σε κάθε ψεκασμό. **Πατάτες:** Για παραγωγή ομοιόμορφων καρπών μεγάλου μεγέθους και αύξηση της στρεμματικής απόδοσης. Α. Πρώιμη πατάτα και πατάτα σποροπαραγωγής: Ψεκασμός με τη διόγκωση των σταλίων όταν οι κόνδυλοι έχουν μέγεθος μπιζελιού. Β. Μεσοπρώιμη πατάτα. Ψεκασμός όταν οι κόνδυλοι έχουν διάμετρο 1,5-2 εκατοστά. Γ. Ποικιλίες που παράγουν λίγους ή μεγάλους κόνδυλους: Δύο ψεκασμοί α) όταν οι κόνδυλοι έχουν μέγεθος μπιζελιού, β) όταν έχουν μέγεθος 1,5-2 εκατοστά. Δόση: 500 κ.εκ. στρέμμα σε κάθε ψεκασμό. **Ζαχαρότευτλα:** Για μεγαλύτερους καρπούς και μεγαλύτερη απόδοση σε ζάχαρη. Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν 6 έως 8 πλήρως ανεπτυγμένα φύλλα. Δόση: 500 κ.εκ./στρέμμα σε κάθε ψεκασμό. **Βαμβάκι:** Για βελτίωση της συγκράτησης των καρυδιών, την ποιότητα της ίνας και αύξηση της παραγωγής. Επιλογή ενός από τα ακόλουθα προγράμματα ψεκασμών. α) Δύο ψεκασμοί. Ο πρώτος με 50 κ.εκ./στρέμμα όταν τα φυτά έχουν 4-10 πραγματικά φύλλα. Ο δεύτερος με 200 κ.εκ./στρέμμα όταν έχουν σχηματισθεί τα μισά χτένια (40-100 χτένια ανά μέτρο γραμμής). β) Δύο ψεκασμοί. Ο πρώτος με 100 κ.εκ./στρέμμα κατά την έναρξη σχηματισμού των χτενιών. Ο δεύτερος με 150 κ.εκ./στρέμμα κατά την έναρξη της άνθησης (10-30 άνθη ανά μέτρο γραμμής). **Ψυχανθή:** (φασόλια, αρακάς): Για παραγωγή ομοιόμορφων καρπών με μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και βελτίωση της στρεμματικής απόδοσης. Εφαρμογή: Ψεκασμός στο ξεκίνημα της άνθησης. Δόση: 500 κ.εκ./στρέμμα. **Καλλωπιστικά:** Για βελτίωση της εμφάνισης, αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης και της παραγωγής, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των λουλουδιών. Α. Βολβώδη: Δύο ψεκασμοί α) κατά την εμφάνιση του ανθοφόρου οφθαλμού, β) μετά την άνθηση. Προσθέστε στο ψεκαστικό υγρό ένα μη ιονικό προσκολλητικό. Β. Τριανταφυλλιάς: Δύο ψεκασμοί α) κατά το φρούσκωμα των ματιών, μετά το κλάδεμα, β) μετά 3-4 εβδομάδες. Γ. Χρυσάνθεμα: Δύο ψεκασμοί α) κατά το σταύρωμα β) μετά 3-4 εβδομάδες. Δ. Άλλα ανθοφόρα καλλωπιστικά φυτά: Ψεκασμός κατά την έκπτυξη των ματιών. Γενική δόση: 500 κ.εκ./στρέμμα ανά ψεκασμό. **Κτηνοτροφικά φυτά (μηδική, βίκος):** Για αύξηση των αποδόσεων. Ψεκασμός με την εμφάνιση της νέας φυλλικής επιφάνειας. Δόση 500 κ.εκ./στρ. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:** -Για όποιες καλλιέργειες δεν υπάρχει σχετική αναφορά, διαλύετε τη συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος ανά στρέμμα σε 30 τουλάχιστον λίτρα νερό ή σε τόσα περισσότερα όσα απαιτούνται για την κάλυψη των φυτικών επιφανειών. - Συνιστάται για καλύτερα αποτελέσματα οι εφαρμογές να γίνονται με δροσερό καιρό. - Αποφύγετε να ψεκάσετε, σε θερμές μέρες με έντονη ηλιοφάνεια. **Συνδυαστικότητα:** Να μην αναμιγνύεται με Headland carnival και με σκευάσματα όξινης αντίδρασης. **Τρόπος εφαρμογής:** Εφαρμογές με ψεκασμό φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού διαλύματος:** Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν την ανοίξετε. Γεμίστε το δοχείο του μέσου εφαρμογής με το μισό απαιτούμενο νερό και ξεκινήστε την ανάδευση. Προσθέστε αργά τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος στο δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **-pH σκευάσματος 7,8-8,8.** **Συνθήκες αποθήκευσης:** Στην αρχική του ερμητικά κλεισμένη συσκευασία, σε δροσερή αποθήκη, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 5°C. **Προφυλάξεις:** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Φοράτε κατάλληλα γάντια. **Πρώτες βοήθειες:** σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν εμφανιστεί ερεθισμός που επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά το δέρμα με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση κατάποσης, πιείτε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής, απομακρύνετε από το σημείο έκθεσης και παρέχετε επαρκή αερισμό. **Τηλ κέντρου δηλητηριάσεων 2107793777**

237

Αρ παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος φιάλης

Περιεχόμενο: 10 ΛΙΤΡΑ

Παρασκευαστής & Διανομέας



1° χλμ. Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100,
19002, Παιανία, Τηλ.: 210.68.00.900,
www.hellafarm.gr, e-mail : info@hellafarm.gr

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ