

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:

Ξεπλύνετε το στόμα με νερό.

Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση αδιαθεσίας. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό παρά μόνο με

ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ

ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων:

210 7793777

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ: Να αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος σε θερμοκρασία 4-25°C.

Αρ. παρτίδας: βλ επί της συσκευασίας

NEMATMYEL

Εδαφοβελτιωτική ουσία

Σύνθεση (β/β): Θείο (SO₃) υδατοδιαλυτό 57.2% Κυκλοφορεί με βάση την Υ.Α. 217217/2004
Σίδηρος (Fe) υδατοδιαλυτός 0.02%

Προέλευση πρώτων υλών: στοιχειακό θείο & θεικός σίδηρος

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**βιολογική
γεωργία**

Περιεχόμενο:
1 Κιλό



ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιβαλές σε
περίπτωση κατάποσης

Παρασκευαστής: **green RESEARCH**

GREEN RESEARCH, S.L.
C/ Grabador Esteve, 26-B*
46004 Valencia (España)
Αντιπρόσωπος: διανομέας για την Ελλάδα



ΑΘΗΝΑ: ΣΤΥΛΙΔΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ.: 210.68.00.909-9, 2310.797.907
e-mail: info@hellafarm.gr

ΣΤΟΧΟΙ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Η ειδική σύνθεση του NEMATMYEL παρέχει στο έδαφος οξυγόνο και θείο που συμβάλουν στην αποδόμηση των πολυσακχαριτών ορισμένων οργανικών συστημάτων του εδάφους ενώ παράλληλα η οξειδωτική ικανότητα του συμπλόκου τετρασθενές θείο/σίδηρος το καθιστά ικανό να διαλύει το χιπινώδες περίβλημα των συστημάτων αυτών. Με τον ίδιο τρόπο συμβάλλει στη διάσπαση των οργανικών αποβλήτων που βρέθηκαν στο έδαφος. Με τη δράση του αυτή το NEMATMYEL εμπλουτίζει το έδαφος με στοιχεία που ισχυροποιούν το φυτό και ακόμα περισσότερο το ριζικό του σύστημα και του δίνει τη δυνατότητα να αντισταθεί σε προσβολές όπως από νηματώδεις. Συνιστάται για καρποφόρα δέντρα, αμπέλι, λαχανικά, και γενικά για όλες τις καλλιέργειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογές στο έδαφος είτε ως διάλυμα είτε μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Γενική δόση: 400-500 γραμμάρια /στρέμμα

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμογή κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας και όποτε κρίνεται σκόπιμο. Για τα επιτραπέζια αμπέλια και τα εσπεριδοειδή, εφαρμογές από την έναρξη κυκλοφορίας των χυμών.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Να εφαρμόζεται μόνο του.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Προτείνεται να εφαρμόζεται με συμβουλή γεωπόνου. Σε περιπτώσεις υποψίας κινδύνου φυτοτοξικότητας να προηγείται δοκιμή μικρής έκτασης.

